

新屬かほつりのがりやす屬

本 田 正 次

M. HONDA: *Ancistrochloa*, a new genus of *Poaceæ*

東北地方ノ山々カラ白馬・立山邊ニカケテ産スルおほひげがりやす (*Calamagrostis grandisetata* TAKEDA) ニヨク似テ、屢々ソレト混同サレテ居ル禾本ニかにつりのがりやす (*Calamagrostis Fauriei* HACKEL) ト云フモノガアリ、産地モ大體同様デアルガ未ダ白馬・立山ノ産ヲ見ナイ。私ノ知ル所デハ後者ノ産地ハ羽後ノ八幡平・羽前ノ月山・陸中ノ焼石岳・岩代ノ飯豊山・上野ノ至佛岳及ビ谷川岳デアリ、而シテ type locality ガ月山トナツテ居ル。兩者ハ實穎ノ先端ガ數條ノ芒狀ニ終ツテ居ル點、實穎ニ長芒ヲ具ヘテ居ル點等同様デアルガ、後者ニアツテハ更ニ花序軸ノ先端ガ長芒狀ヲナシテ小穗カラ超出シテ居ルト云フ著シイ特徴ヲ持ツテ居ル。コノ特徴ハのがりやす屬ニ見ナイ點デアルカラ、茲ニ一新屬かにつりのがりやす屬 (*Ancistrochloa*) ヲ立テ、かにつりのがりやす一種ヲコレニ屬センメテ學名ヲ *Ancistrochloa Fauriei* (HACKEL) HONDA ニ改メルコトニスル。新屬ハのがりやす屬 (*Calamagrostis*) ニ近縁デアルコトハ勿論デアルガ、其ノ他かにつりぐさ屬 (*Trisetum*) 及ビおくやまぬかほ屬 (*Senisetum*) 等ニモ關係ガアル様ニ思ハレル。

***Ancistrochloa* HONDA gen. nov. *Poacearum*.**

Herba perennis, mediocris, caespitosa vel simplex, foliis angustis. Panícula terminalis, erecta, pyramidata vel oblonga. Spiculæ lanceolatae, 1-floræ, flore hermaphrodito. Glumæ 3; 2 inferiores vacuæ, sub articulatione persistentes, carinatae, acuminatae, exaristatae; tertia florens, brevior, dorso ad apicem longe aristata, arista valde recurvata, nervis lateralibus 4 in setas tenues brevesque productis, callo pilis brevibus obsito. Palea brevis, binervis, nervis in setulas excurrentibus. Processus rhachillæ valde elongatus, inferior pilis albis longiusculisque vestitus, superior longe nudus, tenuis, aristiformis, spiculam longiuscule excedens. Stamina 3.

Species unica, endemica in Honshû borealis.

***Ancistrochloa Fauriei* (HACKEL) HONDA comb. nov.**

Calamagrostis Fauriei HACKEL in Bull. Herb. Boiss. (1899) p. 653, et (1904) p. 523; MATSUMURA Ind. Pl. Jap. II. 1. (1905) p. 46; MAKINO et NEMOTO Fl. Jap. ed. 1. (1925) p. 1436, et ed. 2. (1931) p. 1324; HONDA in Journ. Facult. Sci. Imp. Univ. Tokyo, Sect. III, Vol. III. 1. (1930) p. 180.

Calamagrostis grandiseta (non TAKEDA) HONDA l. c. p. 181 pro parte.

Nom Nipp. Kanitsuri-nogariyasu.

Hab.

Honshû: Hachimantai, prov. Ugo (M. MATSUDA, no. 23, anno 1935); in monte Yakeishi-dake, prov. Rikuchû (Y. FUKUDA, no. 52, anno 1931); in monte Gassan, prov. Uzen (S. ISHIZUKA, no. 3, anno ?); ibidem (K. HISAUCHI, no. 30, anno 1923); in monte Iidesan, prov. Iwashiro (G. NAKAHARA, no. 21, anno 1903); in monte Shibutsudake, prov. Kôzuke (S. SAKAGUCHI, no. 6, anno 1930); in monte Tanigawa-dake, prov. Kôzuke (Y. SATAKE, anno 1930).

Planta endemica.

Contributions to the Bryological Flora of Eastern Asia (IV)*

By

Yoshiwo HORIKAWA

堀川芳雄：東亞産苔蘚植物報告（其四）

43) **Conocephalus conicus** (LINNÉ) NECKER Elem. Bot. III. (1791) p. 1604.

Syn. *Marchantia conica* LINNÉ Sp. pl. II. (1763) p. 1604.

Fegatella officinalis RADDI Opusc. sci. d. Bologna II 1818) p. 356.

Fegatella conica CORDA Opiz, Beitr. I (1929) p. 649.

* The expense of the study has been partly defrayed by the Subsidy granted by the Foundation for the Promotion of Scientific and Industrial Research of Japan.

本研究ハ日本學術振興會ノ援助金ニヨツテ遂行サレタモノノ一部ニシテ 東亞及南洋群島苔蘚植物誌（植物學雜誌ニ連載中）ノ姉妹篇デアル。